


L'implantologie

Comprendre votre traitement • Fiche d'information patient

Comprendre l'implant

Un implant remplace la racine d'une dent absente. Placé dans l'os de la mâchoire, il sert de support à une couronne, un bridge ou une prothèse. Le pilier relie l'implant à la restauration visible.



Schémas simplifiés, non à l'échelle.

Un projet adapté à votre situation

L'examen clinique et l'imagerie, lorsqu'elle est indiquée, permettent d'évaluer l'os, les gencives et les dents voisines. Signalez vos maladies, traitements et votre consommation de tabac. Une maladie des gencives doit être prise en charge avant le traitement.

Les étapes du traitement

1. Bilan et discussion des solutions possibles.
2. Pose de l'implant et, si nécessaire, augmentation osseuse.
3. Cicatrisation et intégration de l'implant dans l'os.
4. Réalisation de la prothèse, puis contrôles réguliers.

Le calendrier dépend de votre situation. La cicatrisation peut prendre plusieurs mois ; une dent provisoire immédiate n'est pas toujours possible.

Et si le volume d'os est insuffisant ?

Une greffe ou une régénération osseuse peut être proposée avant ou pendant la pose. Elle vise à obtenir un volume d'os adapté et peut prolonger le traitement.

Bénéfices, alternatives et risques

L'objectif est de retrouver une mastication confortable et un sourire harmonieux. Selon le cas, un bridge ou une prothèse amovible constitue une alternative. Des complications sont possibles : infection, défaut d'intégration, lésion d'un nerf ou du sinus selon la zone, desserrage ou fracture d'un élément prothétique. Le résultat et la durée de vie ne peuvent être garantis.

L'entretien fait partie du traitement

Brossez vos dents deux fois par jour et nettoyez chaque jour autour des implants avec les moyens conseillés au cabinet. Évitez le tabac et respectez le suivi personnalisé. Une inflammation peut provoquer une perte d'os autour de l'implant : c'est la péri-implantite.

Quand appeler le cabinet ?

En cas de douleur persistante, gonflement, saignements répétés, écoulement ou mobilité de la dent sur implant, appelez le cabinet. La mobilité peut venir de la prothèse ou de l'implant : un examen est nécessaire.

Cette fiche accompagne votre consultation. Les consignes postopératoires sont remises séparément et adaptées à l'intervention.

Sources : EFP, Dental implants / FAQs (efp.org/for-patients/dental-implants/faqs/) ; FDA, Dental Implants: What You Should Know. Consultées le 7 octobre 2026.